

PROVA NON ESIMIA

A

SSPCRHO-INF-03-A

ASST RHODENSE ASST SS PAOLO E CARLO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D

QUESTIONARIO

3

VERSIONE

A

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **A**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** VERSIONE **C**

VERSIONE **B**

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

PROVA SCRITTA N: 3

1. Le feci acoliche sono indice di:

- A. Malassorbimento
- B. Ostruzione del tratto biliare
- C. Infezione da Escherichia Coli

2. Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?

- A. Insulina
- B. Farmaci irritanti
- C. Farmaci diuretici

3. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza, prende il nome di:

- A. Modello per piccole équipes
- B. Modello Primary Care
- C. Modello funzionale

4. L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:

- A. Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici
- B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
- C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso

5. Al fine di promuovere la guarigione di una lesione da pressione è indicato:

- A. Frizionare energicamente la cute con garza e soluzione fisiologica
- B. Eliminare o attenuare la pressione sulla lesione
- C. Applicare sempre medicazioni avanzate

6. Durante le fasi del BLS, alla prima analisi effettuata il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come procedi?

- A. Praticare la R.C.P. per 2 minuti
- B. Ricontrolli segni di circolo ogni 30 secondi
- C. Ventilare due volte e riattivi subito l'analisi

7. In caso di ulcera gastrica l'infermiere può rilevare:

- A. Melena
- B. Proctorragia
- C. Emofecie

8. Attraverso quale strumento si rileva il rischio di cadute del paziente?

- A. Scala di Conley
- B. Scala di Norton
- C. Scala di Braden

9. Quale fra queste patologie può provocare insufficienza renale cronica?

- A. Diabete
- B. Sclerosi laterale amiotrofica
- C. Sclerosi multipla

10. Cosa si intende per "area precordiale"?

- A. Un'area dei polmoni a ridosso degli alveoli
- B. L'area cutanea di proiezione del cuore, nella parte anteriore del torace
- C. L'area delle corde vocali

11. In base alle raccomandazioni ministeriali le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco Pericoloso da diluire prima dell'uso"
- B. Chiuse a chiave nella cassaforte dei "Farmaci Stupefacenti"
- C. Insieme ai farmaci per uso parenterale

12. Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:

- A. Eseguire attività fisica per due ore al giorno
- B. Assumere antipertensivi
- C. Condurre una vita normale

13. La teoria di Madeleine Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti:

- A. Al self-care
- B. Alla transculturalità
- C. All'adattamento e alla consapevolezza

14. La terapia palliativa ha come obiettivo:

- A. Il miglioramento della qualità della vita
- B. La guarigione clinica
- C. L'allungamento della vita

15. Il tappo di cerume è causa di:

- A. Ipoacusia di trasmissione
- B. Otagia e acufeni
- C. Disturbi dell'equilibrio

16. Quale tra le seguenti è una caratteristica della meningite cerebrospinale epidemica?

- A. Si trasmette per contatto diretto
- B. Si trasmette per via oro-fecale
- C. Si trasmette attraverso acqua non potabile

17. L'adrenalina trova indicazione in caso di:

- A. Fibrillazione ventricolare
- B. Tachicardia parossistica sopraventricolare
- C. Fibrillazione atriale

18. Indicare quale tra i seguenti NON è un segno/sintomo riscontrabile in un quadro di shock settico:

- A. Cute calda e asciutta
- B. Bradicardia
- C. Ipotensione

19. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere attuato nelle seguenti situazioni:

- A. Le condizioni psichiche della persona richiedono immediati interventi terapeutici
- B. La persona rifiuta il trattamento, ma le sue condizioni psichiche richiedono interventi terapeutici urgenti non attuabili in ambito extra-ospedaliero
- C. Le condizioni psichiche della persona richiedono interventi terapeutici per tutelare la propria e altrui incolumità

20. Con il termine "poichilocitosi" si intende:

- A. Un disturbo delle vie urinarie
- B. La presenza di eritrociti di forme diverse
- C. Una patologia del tratto gastrointestinale

PROVA PRATICA N. 3

La sig.ra Marta, di anni 86, stamane durante una passeggiata è inciampata ed è caduta in avanti col braccio teso. Giunta in Pronto Soccorso è stata sottoposta a intervento chirurgico urgente per frattura dell'omero sinistro. Al termine dell'intervento di "osteosintesi della frattura di omero sinistro" viene accolta presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia.

Durante la valutazione si rilevano i seguenti dati:

- Tendenza ad assopirsi e lieve disorientamento spazio-temporale;
- Dolore: costante nel sito di intervento (8 su 10 secondo scala NRS);
- Polsi radiali palpabili e isosfigmici;
- Assenza di parestesie distali all'arto superiore sinistro;
- PV all'ingresso: PA 136/98 mmHg, FC 98 bpm, FR 24 atti/min; TC 36,2 °C.
- Presenza di CV tipo Foley per il drenaggio a caduta delle urine (presenti nella sacca 200 mL di urine limpide e di colore giallo paglierino);
- In corso infusione endovenosa analgesica tramite CVP posizionato in vena basilica destra (350 mL da infondere a 125 mL/h).

21. L'infermiere rileva il rischio di cadute della sig.ra Marta utilizzando scala Conley. Quale dei seguenti valori indica un rischio di caduta?

- A. 0
- B. 1
- C. 3

22. La scala Conley valuta una serie di variabili. Quali tra le seguenti NON è considerata?

- A. Precedenti cadute
- B. Deterioramento cognitivo
- C. Incontinenza urinaria

23. Quale tra i seguenti interventi risulta prioritario per la prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero?

- A. Monitorare la temperatura ambientale
- B. Verificare che l'illuminazione sia adeguata
- C. Accertarsi della presenza di presidi antidecubito

24. Rispetto alla valutazione del dolore, la scala NRS è una scala di tipo:

- A. Numerale
- B. Nominale
- C. Cromica

25. Il dolore post operatorio può essere rilevato:

- A. Attraverso delle scale validate
- B. Tramite palpazione dell'incisione chirurgica
- C. Monitorando la pressione arteriosa

26. Per quale motivo si rende necessario il posizionamento del catetere vescicale alla sig.ra Marta?

- A. Per il monitoraggio orario della diuresi
- B. Per evitare l'insorgenza di lesioni da decubito
- C. Per prevenire ulteriori cadute accidentali

27. Per il trattamento del dolore il medico prescrive l'analgésico. Prima di procedere con la somministrazione, è bene che l'infermiere verifichi che nella prescrizione siano indicati:

- A. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione
- B. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione, i parametri vitali a cui attenersi
- C. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione, volume di distribuzione

28. Il calibro dei cateteri vescicali viene generalmente misurato in:

- A. Charriere
- B. Gauge
- C. Mercier

29. Quale tra i seguenti interventi deve essere considerato prioritario per la preparazione del paziente sottoposto a intervento chirurgico in urgenza:

- A. Valutare il rischio di cadute
- B. Posizionare un accesso venoso
- C. Somministrare antidolorifici

30. Indicare la corretta sequenza di Vero (V) e Falso (F) per le seguenti affermazioni sulla rilevazione del dolore post-operatorio nell'adulto, di seguito riportate:

- Misurare e documentare il dolore insieme agli altri parametri vitali
- Usare lo stesso strumento di rilevazione del dolore per tutte le persone ricoverate in modo da uniformare il dato
- Misurare il dolore solo quando il paziente riferisce di provarlo
- Rilevare il dolore con scale validate

- A. V - V - F - V
- B. V - V - F - F
- C. V - F - F - V

PROVA NON ESTIMATA

SSPCRHO-INF-03-B

ASST RHODENSE ASST SS PAOLO E CARLO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D

QUESTIONARIO

3

VERSIONE

B

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **B**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** VERSIONE **C**

VERSIONE **B**

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

PROVA SCRITTA N: 3

1. L'adrenalina trova indicazione in caso di:

- A. Fibrillazione ventricolare
- B. Tachicardia parossistica sopraventricolare
- C. Fibrillazione atriale

2. Quale tra le seguenti è una caratteristica della meningite cerebrospinale epidemica?

- A. Si trasmette per contatto diretto
- B. Si trasmette per via oro-fecale
- C. Si trasmette attraverso acqua non potabile

3. La terapia palliativa ha come obiettivo:

- A. Il miglioramento della qualità della vita
- B. La guarigione clinica
- C. L'allungamento della vita

4. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza, prende il nome di:

- A. Modello per piccole équipe
- B. Modello Primary Care
- C. Modello funzionale

5. In caso di ulcera gastrica l'infermiere può rilevare:

- A. Melena
- B. Proctorragia
- C. Emofecie

6. Quale fra queste patologie può provocare insufficienza renale cronica?

- A. Diabete
- B. Sclerosi laterale amiotrofica
- C. Sclerosi multipla

7. Attraverso quale strumento si rileva il rischio di cadute del paziente?

- A. Scala di Conley
- B. Scala di Norton
- C. Scala di Braden

8. La teoria di Madeleine Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti:

- A. Al self-care
- B. Alla transculturalità
- C. All'adattamento e alla consapevolezza

9. Cosa si intende per "area precordiale"?

- A. Un'area dei polmoni a ridosso degli alveoli
- B. L'area cutanea di proiezione del cuore, nella parte anteriore del torace
- C. L'area delle corde vocali

10. Durante le fasi del BLS, alla prima analisi effettuata il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come procedi?

- A. Praticare la R.C.P. per 2 minuti
- B. Ricontrolli segni di circolo ogni 30 secondi
- C. Ventilare due volte e riattivare subito l'analisi

11. L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:

- A. Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici
- B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
- C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso

12. Le feci acoliche sono indice di:

- A. Malassorbimento
- B. Ostruzione del tratto biliare
- C. Infezione da Escherichia Coli

13. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere attuato nelle seguenti situazioni:

- A. Le condizioni psichiche della persona richiedono immediati interventi terapeutici
- B. La persona rifiuta il trattamento, ma le sue condizioni psichiche richiedono interventi terapeutici urgenti non attuabili in ambito extra-ospedaliero
- C. Le condizioni psichiche della persona richiedono interventi terapeutici per tutelare la propria e altrui incolumità

14. Al fine di promuovere la guarigione di una lesione da pressione è indicato:

- A. Frizionare energicamente la cute con garza e soluzione fisiologica
- B. Eliminare o attenuare la pressione sulla lesione
- C. Applicare sempre medicazioni avanzate

15. Con il termine "poichilocitosi" si intende:

- A. Un disturbo delle vie urinarie
- B. La presenza di eritrociti di forme diverse
- C. Una patologia del tratto gastrointestinale

16. Il tappo di cerume è causa di:

- A. Ipoacusia di trasmissione
- B. Otaglia e acufeni
- C. Disturbi dell'equilibrio

17. Indicare quale tra i seguenti NON è un segno/sintomo riscontrabile in un quadro di shock settico:

- A. Cute calda e asciutta
- B. Bradicardia
- C. Ipotensione

18. Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?

- A. Insulina
- B. Farmaci irritanti
- C. Farmaci diuretici

19. Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:

- A. Eseguire attività fisica per due ore al giorno
- B. Assumere antipertensivi
- C. Condurre una vita normale

20. In base alle raccomandazioni ministeriali le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco Pericoloso da diluire prima dell'uso"
- B. Chiuse a chiave nella cassaforte dei "Farmaci Stupefacenti"
- C. Insieme ai farmaci per uso parenterale

PROVA PRATICA N. 3

La sig.ra Marta, di anni 86, stamane durante una passeggiata è inciampata ed è caduta in avanti col braccio teso. Giunta in Pronto Soccorso è stata sottoposta a intervento chirurgico urgente per frattura dell'omero sinistro. Al termine dell'intervento di "osteosintesi della frattura di omero sinistro" viene accolta presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia.

Durante la valutazione si rilevano i seguenti dati:

- Tendenza ad assopirsi e lieve disorientamento spazio-temporale;
- Dolore: costante nel sito di intervento (8 su 10 secondo scala NRS);
- Polsi radiali palpabili e isosfigmici;
- Assenza di parestesie distali all'arto superiore sinistro;
- PV all'ingresso: PA 136/98 mmHg, FC 98 bpm, FR 24 atti/min; TC 36,2 °C.
- Presenza di CV tipo Foley per il drenaggio a caduta delle urine (presenti nella sacca 200 mL di urine limpide e di colore giallo paglierino);
- In corso infusione endovenosa analgesica tramite CVP posizionato in vena basilica destra (350 mL da infondere a 125 mL/h).

21. Per quale motivo si rende necessario il posizionamento del catetere vescicale alla sig.ra Marta?

- A. Per il monitoraggio orario della diuresi
- B. Per evitare l'insorgenza di lesioni da decubito
- C. Per prevenire ulteriori cadute accidentali

22. Quale tra i seguenti interventi risulta prioritario per la prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero?

- A. Monitorare la temperatura ambientale
- B. Verificare che l'illuminazione sia adeguata
- C. Accertarsi della presenza di presidi antidecubito

23. Il dolore post operatorio può essere rilevato:

- A. Attraverso delle scale validate
- B. Tramite palpazione dell'incisione chirurgica
- C. Monitorando la pressione arteriosa

24. Per il trattamento del dolore il medico prescrive l'analgesico. Prima di procedere con la somministrazione, è bene che l'infermiere verifichi che nella prescrizione siano indicati:

- A. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione
- B. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione, i parametri vitali a cui attenersi
- C. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione, volume di distribuzione

25. Indicare la corretta sequenza di Vero (V) e Falso (F) per le seguenti affermazioni sulla rilevazione del dolore post-operatorio nell'adulto, di seguito riportate:

- **Misurare e documentare il dolore insieme agli altri parametri vitali**
- **Usare lo stesso strumento di rilevazione del dolore per tutte le persone ricoverate in modo da uniformare il dato**
- **Misurare il dolore solo quando il paziente riferisce di provarlo**
- **Rilevare il dolore con scale validate**

- A. V – V – F – V
- B. V – V – F – F
- C. V – F – F – V

26. Quale tra i seguenti interventi deve essere considerato prioritario per la preparazione del paziente sottoposto a intervento chirurgico in urgenza:

- A. Valutare il rischio di cadute
- B. Posizionare un accesso venoso
- C. Somministrare antidolorifici

27. Rispetto alla valutazione del dolore, la scala NRS è una scala di tipo:

- A. Numerale
- B. Nominale
- C. Cromica

28. Il calibro dei cateteri vescicali viene generalmente misurato in:

- A. Charriere
- B. Gauge
- C. Mercier

29. L'infermiere rileva il rischio di cadute della sig.ra Marta utilizzando scala Conley. Quale dei seguenti valori indica un rischio di caduta?

- A. 0
- B. 1
- C. 3

30. La scala Conley valuta una serie di variabili. Quali tra le seguenti NON è considerata?

- A. Precedenti cadute
- B. Deterioramento cognitivo
- C. Incontinenza urinaria

ASST RHODENSE ASST SS PAOLO E CARLO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D

QUESTIONARIO

3

VERSIONE

C

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **C**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** VERSIONE **C**

VERSIONE **B**

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

PROVA SCRITTA N: 3

- 1. Durante le fasi del BLS, alla prima analisi effettuata il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come procedi?**
 - A. Praticare la R.C.P. per 2 minuti
 - B. Ricontrolli segni di circolo ogni 30 secondi
 - C. Ventilare due volte e riattivare subito l'analisi

- 2. La terapia palliativa ha come obiettivo:**
 - A. Il miglioramento della qualità della vita
 - B. La guarigione clinica
 - C. L'allungamento della vita

- 3. Il tappo di cerume è causa di:**
 - A. Ipoacusia di trasmissione
 - B. Otagia e acufeni
 - C. Disturbi dell'equilibrio

- 4. La teoria di Madeleine Leininger tratta i problemi dell'infermieristica rivolti:**
 - A. Al self-care
 - B. Alla transculturalità
 - C. All'adattamento e alla consapevolezza

- 5. Attraverso quale strumento si rileva il rischio di cadute del paziente?**
 - A. Scala di Conley
 - B. Scala di Norton
 - C. Scala di Braden

- 6. Le feci acoliche sono indice di:**
 - A. Malassorbimento
 - B. Ostruzione del tratto biliare
 - C. Infezione da Escherichia Coli

- 7. Al fine di promuovere la guarigione di una lesione da pressione è indicato:**
 - A. Frizionare energicamente la cute con garza e soluzione fisiologica
 - B. Eliminare o attenuare la pressione sulla lesione
 - C. Applicare sempre medicazioni avanzate

- 8. Durante il monitoraggio Holter il paziente deve:**
 - A. Eseguire attività fisica per due ore al giorno
 - B. Assumere antipertensivi
 - C. Condurre una vita normale

- 9. Cosa si intende per "area precordiale"?**
 - A. Un'area dei polmoni a ridosso degli alveoli
 - B. L'area cutanea di proiezione del cuore, nella parte anteriore del torace
 - C. L'area delle corde vocali

- 10. Quale fra queste patologie può provocare insufficienza renale cronica?**
 - A. Diabete
 - B. Sclerosi laterale amiotrofica
 - C. Sclerosi multipla

- 11. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in cui l'Infermiere prende in carico totalmente il paziente e ne è responsabile durante la durata della degenza, prende il nome di:**
 - A. Modello per piccole équipes
 - B. Modello Primary Care
 - C. Modello funzionale

12. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) può essere attuato nelle seguenti situazioni:

- A. Le condizioni psichiche della persona richiedono immediati interventi terapeutici
- B. La persona rifiuta il trattamento, ma le sue condizioni psichiche richiedono interventi terapeutici urgenti non attuabili in ambito extra-ospedaliero
- C. Le condizioni psichiche della persona richiedono interventi terapeutici per tutelare la propria e altrui incolumità

13. Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?

- A. Insulina
- B. Farmaci irritanti
- C. Farmaci diuretici

14. In base alle raccomandazioni ministeriali le fiale di KCL devono essere conservate:

- A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco Pericoloso da diluire prima dell'uso"
- B. Chiuse a chiave nella cassaforte dei "Farmaci Stupefacenti"
- C. Insieme ai farmaci per uso parenterale

15. Quale tra le seguenti è una caratteristica della meningite cerebrospinale epidemica?

- A. Si trasmette per contatto diretto
- B. Si trasmette per via oro-fecale
- C. Si trasmette attraverso acqua non potabile

16. In caso di ulcera gastrica l'infermiere può rilevare:

- A. Melena
- B. Proctorragia
- C. Emofioe

17. L'obiettivo principale dell'Incident Reporting è:

- A. Raccogliere dati a fini statistici – epidemiologici
- B. Identificare il rischio e predisporre azioni di miglioramento
- C. Analizzare i sinistri e gestire il contenzioso

18. L'adrenalina trova indicazione in caso di:

- A. Fibrillazione ventricolare
- B. Tachicardia parossistica sopraventricolare
- C. Fibrillazione atriale

19. Indicare quale tra i seguenti NON è un segno/sintomo riscontrabile in un quadro di shock settico:

- A. Cute calda e asciutta
- B. Bradicardia
- C. Ipotensione

20. Con il termine "poichilocitosi" si intende:

- A. Un disturbo delle vie urinarie
- B. La presenza di eritrociti di forme diverse
- C. Una patologia del tratto gastrointestinale

PROVA PRATICA N. 3

La sig.ra Marta, di anni 86, stamane durante una passeggiata è inciampata ed è caduta in avanti col braccio teso. Giunta in Pronto Soccorso è stata sottoposta a intervento chirurgico urgente per frattura dell'omero sinistro. Al termine dell'intervento di "osteosintesi della frattura di omero sinistro" viene accolta presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia.

Durante la valutazione si rilevano i seguenti dati:

- Tendenza ad assopirsi e lieve disorientamento spazio-temporale;
- Dolore: costante nel sito di intervento (8 su 10 secondo scala NRS);
- Polsi radiali palpabili e isosfigmici;
- Assenza di parestesie distali all'arto superiore sinistro;
- PV all'ingresso: PA 136/98 mmHg, FC 98 bpm, FR 24 atti/min; TC 36,2 °C.
- Presenza di CV tipo Foley per il drenaggio a caduta delle urine (presenti nella sacca 200 mL di urine limpide e di colore giallo paglierino);
- In corso infusione endovenosa analgesica tramite CVP posizionato in vena basilica destra (350 mL da infondere a 125 mL/h).

21. La scala Conley valuta una serie di variabili. Quali tra le seguenti NON è considerata?

- A. Precedenti cadute
- B. Deterioramento cognitivo
- C. Incontinenza urinaria

22. Rispetto alla valutazione del dolore, la scala NRS è una scala di tipo:

- A. Numerale
- B. Nominale
- C. Cromica

23. Quale tra i seguenti interventi risulta prioritario per la prevenzione delle cadute in ambito ospedaliero?

- A. Monitorare la temperatura ambientale
- B. Verificare che l'illuminazione che sia adeguata
- C. Accertarsi della presenza di presidi antidecubito

24. Per il trattamento del dolore il medico prescrive l'analgesico. Prima di procedere con la somministrazione, è bene che l'infermiere verifichi che nella prescrizione siano indicati:

- A. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione
- B. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione, i parametri vitali a cui attenersi
- C. Nome e cognome del paziente, nome del farmaco/principio attivo, dosaggio, via di somministrazione, frequenza e orari di somministrazione, volume di distribuzione

25. Indicare la corretta sequenza di Vero (V) e Falso (F) per le seguenti affermazioni sulla rilevazione del dolore post-operatorio nell'adulto, di seguito riportate:

- Misurare e documentare il dolore insieme agli altri parametri vitali
- Usare lo stesso strumento di rilevazione del dolore per tutte le persone ricoverate in modo da uniformare il dato
- Misurare il dolore solo quando il paziente riferisce di provarlo
- Rilevare il dolore con scale validate

- A. V – V – F – V
- B. V – V – F – F
- C. V – F – F – V

26. Quale tra i seguenti interventi deve essere considerato prioritario per la preparazione del paziente sottoposto a intervento chirurgico in urgenza:

- A. Valutare il rischio di cadute
- B. Posizionare un accesso venoso
- C. Somministrare antidolorifici

27. Per quale motivo si rende necessario il posizionamento del catetere vescicale alla sig.ra Marta?

- A. Per il monitoraggio orario della diuresi
- B. Per evitare l'insorgenza di lesioni da decubito
- C. Per prevenire ulteriori cadute accidentali

28. L'infermiere rileva il rischio di cadute della sig.ra Marta utilizzando scala Conley. Quale dei seguenti valori indica un rischio di caduta?

- A. 0
- B. 1
- C. 3

29. Il dolore post operatorio può essere rilevato:

- A. Attraverso delle scale validate
- B. Tramite palpazione dell'incisione chirurgica
- C. Monitorando la pressione arteriosa

30. Il calibro dei cateteri vescicali viene generalmente misurato in:

- A. Charriere
- B. Gauge
- C. Mercier