

ASST RHODENSE ASST SS PAOLO E CARLO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D

QUESTIONARIO

4

VERSIONE

A

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **A**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** ☒ VERSIONE **C** ☐

VERSIONE **B** ☐

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

PROVA SCRITTA N: 4

1. Indicare quale delle seguenti patologie si può trasmettere per via ematica:

- A. Epatite C
- B. Sarcoidosi
- C. Toxoplasmosi

2. Cosa si intende per T.I.A.?

- A. Trombosi improvvisa acuta
- B. Attacco ischemico transitorio
- C. Turba ischemica acuta

3. È consentito aggiungere farmaci alla sacca di sangue intero durante un'emotrasfusione?

- A. Sì, ma solo cristalloidi in caso di shock ipovolemico
- B. Sì, ma solo colloidi in caso di shock ipovolemico
- C. No, mai

4. La manovra di Giordano viene effettuata per la diagnosi di patologia:

- A. Renale
- B. Epatica
- C. Appendicolare

5. La posizione di Fowler consente:

- A. La palpazione della prostata
- B. La somministrazione di clistere evacuativo
- C. Una migliore funzionalità respiratoria

6. Per sterilizzazione si intende:

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi e di altri agenti biologici, comprese le spore

7. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività in cui ad ogni infermiere sono assegnate specifiche prestazioni, prende il nome di:

- A. Modello per intensità di cura
- B. Modello per piccole équipe
- C. Modello funzionale o per compiti

8. Tutti i seguenti sono fattori di rischio estrinseci per le cadute, tranne:

- A. Pavimenti e scale scivolosi
- B. Deterioramento dello stato cognitivo
- C. Bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia

9. Nell'ostruzione delle vie biliari a livello del coledoco, le feci si presentano:

- A. Picee
- B. Giallastre
- C. Bianco-grigiastre

10. Per "Frazione di Eiezione" si intende:

- A. La frazione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, durante la sistole
- B. La frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
- C. La frazione o porzione di sangue di riempimento del ventricolo sinistro durante la diastole

11. In sanità pubblica, cosa si intende con l'acronimo "LEA"?

- A. Livelli essenziali di accreditamento
- B. Livelli essenziali di assistenza
- C. Livelli essenziali di appropriatezza

12. La terapia con ferro per via orale può causare:

- A. Tachicardia
- B. Ipertensione arteriosa
- C. Disturbi gastrointestinali

13. Per quale procedura è utilizzato il catetere di Fogarty?

- A. Cateterismo vescicale
- B. Cateterismo cardiaco
- C. Embolectomia

14. L'indice di APGAR viene utilizzato per valutare:

- A. La condizione di salute del neonato
- B. Il rischio di cadute
- C. Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito

15. Per l'esame della glicosuria è necessario:

- A. Un prelievo di sangue a digiuno
- B. Un campione di urine, prelevato dalla prima minzione mattutina
- C. Somministrare un carico orale di glucosio

16. Qual è lo scopo della prevenzione terziaria?

- A. Evitare il più possibile le complicanze, le probabilità di recidive e la morte
- B. Identificare i soggetti asintomatici affetti da una specifica malattia
- C. Effettuare diagnosi precoce

17. Si definisce anuria:

- A. L'emissione d'urina, da parte dell'apparato urinario, inferiore a 100 ml al giorno, quantità considerata minima accettabile
- B. L'incapacità di svuotare completamente la vescica a causa di alterazioni a carico dello sfintere uretrale o del muscolo detrusore
- C. La necessità di urinare più volte durante il giorno, di notte, o in entrambi i momenti, ma in volumi normali o inferiori al normale

18. La teoria dei bisogni vede tra i suoi massimi esponenti:

- A. V. Henderson
- B. H. Peplau
- C. C. Roy

19. L'obbligo formativo ECM riguarda:

- A. Tutti i professionisti sanitari
- B. Solo i dipendenti della sanità pubblica
- C. Solo i dipendenti della sanità privata o libero-professionisti

20. Nella steatosi epatica si verifica un accumulo nel fegato di:

- A. Lipidi
- B. Lipasi
- C. Sostanza amiloide

PROVA PRATICA N. 4

Il signor Bianchi di 60 anni, altezza cm 165, peso di Kg 85, si presenta in Pronto Soccorso riferendo lieve dolore retrosternale, nausea e sudorazione algida. Riferisce all'infermiere del triage che lo accoglie, che i sintomi sono causati dalla stanchezza per aver effettuato un lungo tragitto in bicicletta, ma appare visibilmente agitato e preoccupato. Vengono effettuati un elettrocardiogramma ed un prelievo ematico urgente, con diagnosi di infarto miocardico acuto.

21. Durante l'esecuzione dell'elettrocardiogramma al signor Bianchi, l'infermiere nota un'alterazione del tracciato. Quale delle seguenti alterazioni può corrispondere alla diagnosi di infarto miocardico acuto:

- A. Alterato rapporto tra onda P ed il QRS
- B. Scomparsa dell'onda P
- C. Sopraslivellamento del tratto ST

22. Quale alterazione dei seguenti esami di laboratorio depone per un infarto del miocardio?

- A. Aumento dell'ematocrito
- B. Aumento del tempo di protrombina
- C. Aumento del CPK Mb

23. Quale tra i seguenti parametri deve essere monitorato in fase acuta durante un infarto del miocardio?

- A. Diuresi
- B. Alvo
- C. Temperatura corporea

24. Il medico decide di eseguire una coronarografia. A tal fine il consenso informato è:

- A. Una condizione di liceità per l'agire dell'operatore sanitario
- B. Una condizione necessaria per il ricovero
- C. Uno strumento di educazione sanitaria sui rischi della procedura

25. Quali suggerimenti dovrà dare l'infermiere al signor Bianchi al momento della dimissione per promuovere la salute?

- A. Conservare le proprie abitudini alimentari e lo stile di vita per non sviluppare ulteriori stati di stress
- B. Restare a riposo per un periodo il più prolungato possibile e assumere una dieta ipocalorica
- C. Evitare le attività che possono scatenare il dolore toracico, seguendo un regime di allenamento fisico programmato coadiuvato da una dieta ipocalorica

26. Per effettuare le manovre di BLS è necessario posizionare l'assistito in:

- A. Posizione di sicurezza su un piano rigido
- B. Decubito supino con il capo, il tronco e gli arti allineati lungo il corpo su un piano rigido
- C. Semiseduto con il capo iperesteso su un piano rigido

27. Per garantire la pervietà delle vie aeree è necessario:

- A. Porre le mani sotto la testa della persona e sollevarla
- B. Sollevare con due dita il mento e spingere la testa all'indietro appoggiando l'altra mano sulla fronte
- C. Ruotare prima a destra e poi a sinistra la testa della persona ed iperestendere il collo

28. Per garantire la pervietà delle vie aeree, la cannula orofaringea deve essere introdotta nella cavità orale della persona assistita con la concavità:

- A. Rivolta verso il palato e poi ruotata di 180°
- B. Rivolta verso la lingua e poi ruotata di 180°
- C. Rivolta verso l'angolo della rima labiale e poi ruotata di 90°

29. Gli esami ematici richiesti comprendono gli elettroliti sierici. Indicare il range di normalità del potassio:

- A. 3,5 – 5,5 mEq/L
- B. 35 – 55 mEq/L
- C. 350 – 550 mEq/L

30. Quale tra le seguenti aritmie può condurre ad arresto cardiaco?

- A. Fibrillazione atriale
- B. Fibrillazione ventricolare
- C. Flutter atriale

ASST RHODENSE ASST SS PAOLO E CARLO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D

QUESTIONARIO

4

VERSIONE

B

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **B**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** ☐ VERSIONE **C** ☐

VERSIONE **B** ☒

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

PROVA SCRITTA N: 4

1. Tutti i seguenti sono fattori di rischio estrinseci per le cadute, tranne:

- A. Pavimenti e scale scivolosi
- B. Deterioramento dello stato cognitivo
- C. Bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia

2. Qual è lo scopo della prevenzione terziaria?

- A. Evitare il più possibile le complicanze, le probabilità di recidive e la morte
- B. Identificare i soggetti asintomatici affetti da una specifica malattia
- C. Effettuare diagnosi precoce

3. L'obbligo formativo ECM riguarda:

- A. Tutti i professionisti sanitari
- B. Solo i dipendenti della sanità pubblica
- C. Solo i dipendenti della sanità privata o libero-professionisti

4. La terapia con ferro per via orale può causare:

- A. Tachicardia
- B. Ipertensione arteriosa
- C. Disturbi gastrointestinali

5. Nella steatosi epatica si verifica un accumulo nel fegato di:

- A. Lipidi
- B. Lipasi
- C. Sostanza amiloide

6. Per l'esame della glicosuria è necessario:

- A. Un prelievo di sangue a digiuno
- B. Un campione di urine, prelevato dalla prima minzione mattutina
- C. Somministrare un carico orale di glucosio

7. Si definisce anuria:

- A. L'emissione d'urina, da parte dell'apparato urinario, inferiore a 100 ml al giorno, quantità considerata minima accettabile
- B. L'incapacità di svuotare completamente la vescica a causa di alterazioni a carico dello sfintere uretrale o del muscolo detrusore
- C. La necessità di urinare più volte durante il giorno, di notte, o in entrambi i momenti, ma in volumi normali o inferiori al normale

8. Per quale procedura è utilizzato il catetere di Fogarty?

- A. Cateterismo vescicale
- B. Cateterismo cardiaco
- C. Embolectomia

9. Cosa si intende per T.I.A.?

- A. Trombosi improvvisa acuta
- B. Attacco ischemico transitorio
- C. Turba ischemica acuta

10. Per "Frazione di Eiezione" si intende:

- A. La frazione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, durante la sistole
- B. La frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
- C. La frazione o porzione di sangue di riempimento del ventricolo sinistro durante la diastole

11. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività in cui ad ogni infermiere sono assegnate specifiche prestazioni, prende il nome di:

- A. Modello per intensità di cura
- B. Modello per piccole équipe
- C. Modello funzionale o per compiti

12. È consentito aggiungere farmaci alla sacca di sangue intero durante un'emotrasfusione?

- A. Sì, ma solo cristalloidi in caso di shock ipovolemico
- B. Sì, ma solo colloidi in caso di shock ipovolemico
- C. No, mai

13. La posizione di Fowler consente:

- A. La palpazione della prostata
- B. La somministrazione di clistere evacuativo
- C. Una migliore funzionalità respiratoria

14. La teoria dei bisogni vede tra i suoi massimi esponenti:

- A. V. Henderson
- B. H. Peplau
- C. C. Roy

15. Per sterilizzazione si intende:

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi e di altri agenti biologici, comprese le spore

16. In sanità pubblica, cosa si intende con l'acronimo "LEA"?

- A. Livelli essenziali di accreditamento
- B. Livelli essenziali di assistenza
- C. Livelli essenziali di appropriatezza

17. Nell'ostruzione delle vie biliari a livello del coledoco, le feci si presentano:

- A. Picee
- B. Giallastre
- C. Bianco-grigiastre

18. L'indice di APGAR viene utilizzato per valutare:

- A. La condizione di salute del neonato
- B. Il rischio di cadute
- C. Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito

19. La manovra di Giordano viene effettuata per la diagnosi di patologia:

- A. Renale
- B. Epatica
- C. Appendicolare

20. Indicare quale delle seguenti patologie si può trasmettere per via ematica:

- A. Epatite C
- B. Sarcoidosi
- C. Toxoplasmosi

PROVA PRATICA N. 4

Il signor Bianchi di 60 anni, altezza cm 165, peso di Kg 85, si presenta in Pronto Soccorso riferendo lieve dolore retrosternale, nausea e sudorazione algida. Riferisce all'infermiere del triage che lo accoglie, che i sintomi sono causati dalla stanchezza per aver effettuato un lungo tragitto in bicicletta, ma appare visibilmente agitato e preoccupato. Vengono effettuati un elettrocardiogramma ed un prelievo ematico urgente, con diagnosi di infarto miocardio acuto.

21. Per effettuare le manovre di BLS è necessario posizionare l'assistito in:

- A. Posizione di sicurezza su un piano rigido
- B. Decubito supino con il capo, il tronco e gli arti allineati lungo il corpo su un piano rigido
- C. Semiseduto con il capo iperesteso su un piano rigido

22. Quale alterazione dei seguenti esami di laboratorio depone per un infarto del miocardio?

- A. Aumento dell'ematocrito
- B. Aumento del tempo di protrombina
- C. Aumento del CPK Mb

23. Per garantire la pervietà delle vie aeree, la cannula orofaringea deve essere introdotta nella cavità orale della persona assistita con la concavità:

- A. Rivolta verso il palato e poi ruotata di 180°
- B. Rivolta verso la lingua e poi ruotata di 180°
- C. Rivolta verso l'angolo della rima labiale e poi ruotata di 90°

24. Gli esami ematici richiesti comprendono gli elettroliti sierici. Indicare il range di normalità del potassio:

- A. 3,5 – 5,5 mEq/L
- B. 35 – 55 mEq/L
- C. 350 – 550 mEq/L

25. Quali suggerimenti dovrà dare l'infermiere al signor Bianchi al momento della dimissione per promuovere la salute?

- A. Conservare le proprie abitudini alimentari e lo stile di vita per non sviluppare ulteriori stati di stress
- B. Restare a riposo per un periodo il più prolungato possibile e assumere una dieta ipocalorica
- C. Evitare le attività che possono scatenare il dolore toracico, seguendo un regime di allenamento fisico programmato coadiuvato da una dieta ipocalorica

26. Durante l'esecuzione dell'elettrocardiogramma al signor Bianchi, l'infermiere nota un'alterazione del tracciato. Quale delle seguenti alterazioni può corrispondere alla diagnosi di infarto miocardico acuto:

- A. Alterato rapporto tra onda P ed il QRS
- B. Scomparsa dell'onda P
- C. Sopraslivellamento del tratto ST

27. Il medico decide di eseguire una coronarografia. A tal fine il consenso informato è:

- A. Una condizione di liceità per l'agire dell'operatore sanitario
- B. Una condizione necessaria per il ricovero
- C. Uno strumento di educazione sanitaria sui rischi della procedura

28. Per garantire la pervietà delle vie aeree è necessario:

- A. Porre le mani sotto la testa della persona e sollevarla
- B. Sollevare con due dita il mento e spingere la testa all'indietro appoggiando l'altra mano sulla fronte
- C. Ruotare prima a destra e poi a sinistra la testa della persona ed iperestendere il collo

29. Quale tra i seguenti parametri deve essere monitorato in fase acuta durante un infarto del miocardio?

- A. Diuresi
- B. Alvo
- C. Temperatura corporea

30. Quale tra le seguenti aritmie può condurre ad arresto cardiaco?

- A. Fibrillazione atriale
- B. Fibrillazione ventricolare
- C. Flutter atriale

ASST RHODENSE ASST SS PAOLO E CARLO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 40 POSTI DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - CAT. D

QUESTIONARIO

4

VERSIONE

C

ISTRUZIONE IMPORTANTE

In alto sul MODULO RISPOSTE, in corrispondenza del riquadro
"ANNERIRE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA VERSIONE DEL
QUESTIONARIO",

annerire la VERSIONE **C**, come indicato di seguito:

VERSIONE **A** ☐ VERSIONE **C** ☒

VERSIONE **B** ☐

NON STRAPPARE

l'involucro di plastica prima che venga dato il
segnale di inizio della prova

PROVA SCRITTA N: 4

- 1. Indicare quale delle seguenti patologie si può trasmettere per via ematica:**
 - A. Epatite C
 - B. Sarcoidosi
 - C. Toxoplasmosi
- 2. Tutti i seguenti sono fattori di rischio estrinseci per le cadute, tranne:**
 - A. Pavimenti e scale scivolosi
 - B. Deterioramento dello stato cognitivo
 - C. Bagni senza supporti per sollevarsi dal WC o per fare la doccia
- 3. L'obbligo formativo ECM riguarda:**
 - A. Tutti i professionisti sanitari
 - B. Solo i dipendenti della sanità pubblica
 - C. Solo i dipendenti della sanità privata o libero-professionisti
- 4. Nella steatosi epatica si verifica un accumulo nel fegato di:**
 - A. Lipidi
 - B. Lipasi
 - C. Sostanza amiloide
- 5. Qual è lo scopo della prevenzione terziaria?**
 - A. Evitare il più possibile le complicanze, le probabilità di recidive e la morte
 - B. Identificare i soggetti asintomatici affetti da una specifica malattia
 - C. Effettuare diagnosi precoce
- 6. La terapia con ferro per via orale può causare:**
 - A. Tachicardia
 - B. Ipertensione arteriosa
 - C. Disturbi gastrointestinali
- 7. La manovra di Giordano viene effettuata per la diagnosi di patologia:**
 - A. Renale
 - B. Epatica
 - C. Appendicolare
- 8. Cosa si intende per T.I.A.?**
 - A. Trombosi improvvisa acuta
 - B. Attacco ischemico transitorio
 - C. Turba ischemica acuta
- 9. Per quale procedura è utilizzato il catetere di Fogarty?**
 - A. Cateterismo vescicale
 - B. Cateterismo cardiaco
 - C. Embolectomia
- 10. L'indice di APGAR viene utilizzato per valutare:**
 - A. La condizione di salute del neonato
 - B. Il rischio di cadute
 - C. Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
- 11. Per l'esame della glicosuria è necessario:**
 - A. Un prelievo di sangue a digiuno
 - B. Un campione di urine, prelevato dalla prima minzione mattutina
 - C. Somministrare un carico orale di glucosio

12. Si definisce anuria:

- A. L'emissione d'urina, da parte dell'apparato urinario, inferiore a 100 ml al giorno, quantità considerata minima accettabile
- B. L'incapacità di svuotare completamente la vescica a causa di alterazioni a carico dello sfintere uretrale o del muscolo detrusore
- C. La necessità di urinare più volte durante il giorno, di notte, o in entrambi i momenti, ma in volumi normali o inferiori al normale

13. Per sterilizzazione si intende:

- A. La distruzione certa degli agenti patogeni non sporigeni e la riduzione accentuata della presenza dei batteri non patogeni e non sporigeni
- B. Complesso di procedimenti e operazioni atti alla rimozione di materiale organico e inorganico dagli oggetti
- C. Processo, fisico o chimico, che porta alla distruzione di tutte le forme di microorganismi viventi e di altri agenti biologici, comprese le spore

14. Nell'ostruzione delle vie biliari a livello del coledoco, le feci si presentano:

- A. Picee
- B. Giallastre
- C. Bianco-grigiastre

15. È consentito aggiungere farmaci alla sacca di sangue intero durante un'emotrasfusione?

- A. Sì, ma solo cristalloidi in caso di shock ipovolemico
- B. Sì, ma solo colloidi in caso di shock ipovolemico
- C. No, mai

16. La posizione di Fowler consente:

- A. La palpazione della prostata
- B. La somministrazione di clistere evacuativo
- C. Una migliore funzionalità respiratoria

17. Il modello assistenziale caratterizzato da un'organizzazione del lavoro in serie per linee di attività in cui ad ogni infermiere sono assegnate specifiche prestazioni, prende il nome di:

- A. Modello per intensità di cura
- B. Modello per piccole équipe
- C. Modello funzionale o per compiti

18. In sanità pubblica, cosa si intende con l'acronimo "LEA"?

- A. Livelli essenziali di accreditamento
- B. Livelli essenziali di assistenza
- C. Livelli essenziali di appropriatezza

19. Per "Frazione di Eiezione" si intende:

- A. La frazione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, durante la sistole
- B. La frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
- C. La frazione o porzione di sangue di riempimento del ventricolo sinistro durante la diastole

20. La teoria dei bisogni vede tra i suoi massimi esponenti:

- A. V. Henderson
- B. H. Peplau
- C. C. Roy

PROVA PRATICA N. 4

Il signor Bianchi di 60 anni, altezza cm 165, peso di Kg 85, si presenta in Pronto Soccorso riferendo lieve dolore retrosternale, nausea e sudorazione algida. Riferisce all'infermiere del triage che lo accoglie, che i sintomi sono causati dalla stanchezza per aver effettuato un lungo tragitto in bicicletta, ma appare visibilmente agitato e preoccupato. Vengono effettuati un elettrocardiogramma ed un prelievo ematico urgente, con diagnosi di infarto miocardico acuto.

21. Quali suggerimenti dovrà dare l'infermiere al signor Bianchi al momento della dimissione per promuovere la salute?

- A. Conservare le proprie abitudini alimentari e lo stile di vita per non sviluppare ulteriori stati di stress
- B. Restare a riposo per un periodo il più prolungato possibile e assumere una dieta ipocalorica
- C. Evitare le attività che possono scatenare il dolore toracico, seguendo un regime di allenamento fisico programmato coadiuvato da una dieta ipocalorica

22. Quale alterazione dei seguenti esami di laboratorio depone per un infarto del miocardio?

- A. Aumento dell'ematocrito
- B. Aumento del tempo di protrombina
- C. Aumento del CPK Mb

23. Per garantire la pervietà delle vie aeree è necessario:

- A. Porre le mani sotto la testa della persona e sollevarla
- B. Sollevare con due dita il mento e spingere la testa all'indietro appoggiando l'altra mano sulla fronte
- C. Ruotare prima a destra e poi a sinistra la testa della persona ed iperestendere il collo

24. Durante l'esecuzione dell'elettrocardiogramma al signor Bianchi, l'infermiere nota un'alterazione del tracciato. Quale delle seguenti alterazioni può corrispondere alla diagnosi di infarto miocardico acuto:

- A. Alterato rapporto tra onda P ed il QRS
- B. Scomparsa dell'onda P
- C. Sopraslivellamento del tratto ST

25. Quale tra le seguenti aritmie può condurre ad arresto cardiaco?

- A. Fibrillazione atriale
- B. Fibrillazione ventricolare
- C. Flutter atriale

26. Gli esami ematici richiesti comprendono gli elettroliti sierici. Indicare il range di normalità del potassio:

- A. 3,5 – 5,5 mEq/L
- B. 35 – 55 mEq/L
- C. 350 – 550 mEq/L

27. Per effettuare le manovre di BLS è necessario posizionare l'assistito in:

- A. Posizione di sicurezza su un piano rigido
- B. Decubito supino con il capo, il tronco e gli arti allineati lungo il corpo su un piano rigido
- C. Semiseduto con il capo iperesteso su un piano rigido

28. Il medico decide di eseguire una coronarografia. A tal fine il consenso informato è:

- A. Una condizione di liceità per l'agire dell'operatore sanitario
- B. Una condizione necessaria per il ricovero
- C. Uno strumento di educazione sanitaria sui rischi della procedura

29. Per garantire la pervietà delle vie aeree, la cannula orofaringea deve essere introdotta nella cavità orale della persona assistita con la concavità:

- A. Rivolta verso il palato e poi ruotata di 180°
- B. Rivolta verso la lingua e poi ruotata di 180°
- C. Rivolta verso l'angolo della rima labiale e poi ruotata di 90°

30. Quale tra i seguenti parametri deve essere monitorato in fase acuta durante un infarto del miocardio?

- A. Diuresi
- B. Alvo
- C. Temperatura corporea