

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

PROVA SCRITTA N. 1

1. **Con il termine APNEA si intende:**
 - a. Assenza di atti respiratori per un periodo > 15 secondi
 - b. Aumento della frequenza e della profondità degli atti respiratori
 - c. Diminuzione della frequenza respiratoria durante il sonno

2. **Durante l'inserimento del sondino nasogastrico il paziente deve essere istruito a:**
 - a. Assumere la posizione supina e tossire al passaggio del sondino
 - b. Tenere il capo inclinato in avanti e deglutire al passaggio del sondino
 - c. Tenere il capo esteso all'indietro e deglutire al passaggio del sondino

3. **A chi è rivolta la prevenzione primaria?**
 - a. Soggetto sano
 - b. Soggetto sintomatico
 - c. Soggetto malato

4. **Cosa si intende per OLIGURIA?**
 - a. Ridotta produzione di urina, con escrezione di un volume < 500 ml/24 ore
 - b. Aumentata produzione di urina, con escrezione di un volume > 1500 ml/24 ore
 - c. Ridotta produzione di urina, con escrezione di un volume < 1000 ml/24 ore

5. **Nel paziente portatore di catetere vescicale è appropriato:**
 - a. Sracordare il circuito chiuso di raccolta urine
 - b. Utilizzare il talco dopo l'igiene perineale
 - c. Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica

6. **Il paziente NON è cosciente, respira, ha segni di circolo. Indicare l'evento prioritario:**
 - a. Avvisiamo il 118 e iniziamo le procedure DAE
 - b. Iniziamo le compressioni toraciche
 - c. Mettiamo il paziente in posizione laterale di sicurezza

7. **In un adulto a digiuno quali sono i valori glicemici ritenuti normali:**
 - a. 200 mg/dl
 - b. 60-99 mg/dl
 - c. 50 mg/dl

8. **Per PVC si definisce:**
 - a. Pressione Venosa Centrale
 - b. Pressione Intra Addominale
 - c. Pressione intra Cranica

*Prova esonata
Luogo h. 8.30*



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

9. **Nell'ECG si utilizzano:**

- a. 10 elettrodi: 6 pericordiali e 4 periferici
- b. 12 elettrodi: 6 pericordiali e 6 periferici
- c. 12 elettrodi: 7 pericordiali e 5 periferici

10. **Per la valutazione del rischio caduta è possibile utilizzare la scala:**

- a. Stratify
- b. VAS
- c. Braden

11. **La Legge 42 del 1999 rappresenta un punto di svolta per:**

- a. Abrogazione del "Mansionario" (DPR 225/1974)
- b. Avvio delle lauree magistrali
- c. Implementazione della formazione ECM in Italia

12. **Quali tra i seguenti principi attivi è un diuretico?**

- a. Paracetamolo
- b. Morfina
- c. Furosemide

13. **I drenaggi, in base al principio di funzionamento, si distinguono in:**

- a. Toracico e addominale
- b. Venoso e arterioso
- c. Caduta e aspirazione

14. **La disidratazione è caratterizzata da:**

- a. Ipotensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
- b. Iperensione, secchezza della cute, oliguria, tachicardia
- c. Iperensione, secchezza della cute, poliuria, tachicardia

15. **Cosa si intende per ferita?**

- a. Perdita di uno strato di epitelio in seguito a trauma
- b. Perdita della soluzione di continuo della cute o della mucosa
- c. Lesione causata da un oggetto tagliente

16. **Tra le malattie che si trasmettono per via aerea:**

- a. La tubercolosi
- b. Tumore polmonare
- c. Clostridium Difficile

17. **L'adeguata cura del piede diabetico NON comprende:**

- a. Utilizzo di calzature comode
- b. Mantenimento dell'idratazione cutanea
- c. Frequente utilizzo di anestetici locali

*Prac esonate
tutto h 8.30*



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

18. **L'indice di APGAR viene utilizzato per valutare:**
- La condizione di salute del neonato
 - Il rischio di cadute
 - Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito
19. **Da quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, possono essere determinati i fenomeni di lipodistrofia?**
- Insulina
 - Farmaci irritanti
 - Farmaci diuretici
20. **La pulizia della cute peristomale, in un paziente portatore di colostomia, solitamente viene effettuata:**
- Con acqua e sapone neutro
 - Con acqua e soluzione alcolica
 - Con soluzione antisettica
21. **Per D.P.I si intende:**
- Un Dispositivo di Prevenzione Individuale
 - Un Dispositivo di Protezione Individuale
 - Un Dispositivo di Prevenzione delle Infezioni
22. **Chi si occupa di constatare il decesso?**
- Il medico
 - L'infermiere
 - L'OSS
23. **L'incapacità a deglutire è definita:**
- Disartria
 - Disfagia
 - Dispepsia
24. **Le complicanze della Nutrizione Enterale possono essere:**
- Metaboliche
 - Gastroenteriche
 - Tutte le precedenti
25. **Quali tra quelli indicati rappresentano i sintomi di esordio di una crisi vagale:**
- Ipotensione, bradicardia, nausea, sudorazione
 - Crisi ipertensiva, bradicardia, nausea, ipertermia
 - Crisi ipertensiva, tachicardia, nausea, ipotermia
26. **Quale, tra le seguenti, NON è una sede per la rilevazione della temperatura corporea:**
- Rettale
 - Ascellare
 - Sottomammaria

*Primo esatto
tempo h. 8 30*





N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

27. È indicata la sospensione della nutrizione enterale mediante sondino nasogastrico se:

- a. Il paziente riposa nelle ore pomeridiane
- b. Durante le ore notturne
- c. Presenza di emesi e vomito incoercibile

28. Per l'esame della glicosuria è necessario:

- a. Un prelievo di sangue a digiuno
- b. Un campione di urine, prelevato dalla prima minzione mattutina
- c. Somministrare un carico orale di glucosio

29. La terapia palliativa ha come obiettivo:

- a. Il miglioramento della qualità di vita
- b. La guarigione clinica
- c. L'allungamento della vita

30. L'infermiere nel suo agire professionale:

- a. Non è tenuto alla compilazione della documentazione clinica della persona assistita
- b. Si occupa esclusivamente del paziente e non tiene conto dei famigliari e delle persone di riferimento dell'assistito
- c. Si attiene alle linee guida e alle buone pratiche clinico assistenziali, promuovendone il continuo aggiornamento

*Prace estratto
Turno h 8.30*



05/06/2024

RHO



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

PROVA SCRITTA 2

1. **Con il termine DISPNEA si intende:**
 - a. Difficoltà respiratoria
 - b. Difficoltà nell'eseguire la tosse
 - c. Difficoltà nel reperire un accesso venoso

2. **Durante un'aspirazione endotracheale con sondino di Nelaton è corretto:**
 - a. Sospendere la somministrazione di ossigeno
 - b. Aspirare durante l'introduzione della sonda
 - c. Aspirare durante la rimozione della sonda

3. **I test di screening rientrano nella prevenzione:**
 - a. Primaria
 - b. Secondaria
 - c. Terziaria

4. **Cosa si intende con il termine ANURIA?**
 - a. Diuresi < 100ml/24 ore
 - b. Diuresi > 1000ml/24 ore
 - c. Diuresi < 1ml/24 ore

5. **Nel paziente portatore di catetere vescicale NON è appropriato:**
 - a. Tenere la sacca di drenaggio sotto il livello della vescica
 - b. Utilizzare il talco dopo l'igiene perineale
 - c. Garantire il circuito chiuso di raccolta urine

6. **Perché è necessario sospendere la R.C.P durante la scarica effettuata dal DAE?**
 - a. Per non ricevere un'elettrocuzione
 - b. Per non creare artefatti
 - c. Per mantenere un circolo efficace

7. **Sotto quali valori un adulto a digiuno può essere considerato ipoglicemico:**
 - a. < 10 mg/dl
 - b. > 100 mg/dl
 - c. < 60 mg/dl

8. **Durante la misurazione della PVC (pressione venosa centrale) il paziente deve essere in posizione:**
 - a. Ortostatica
 - b. Prona
 - c. Supina

PROVA NON ESTRATTA

h. 11⁰⁰





N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

9. La tracheostomia è:

- a. La creazione di un'apertura permanente della trachea, tramite abboccamento della breccia tracheale alla cute degli anelli tracheali (mediante sutura) e conseguente contatto diretto con l'ambiente esterno
- b. Un dispositivo vascolare
- c. Un'apertura creata chirurgicamente, attraverso la quale una piccola porzione del colon viene fatta fuoriuscire sulla superficie dell'addome.

10. Per la valutazione del delirium viene utilizzata la scala:

- a. Norton
- b. Braden
- c. RASS

11. Relativamente al campo di applicazione dell'infermiere, la Legge 42 del 1999 fa riferimento a:

- a. Ordinamenti didattici base e post base, Profilo Professionale e Codice Deontologico
- b. Avvio delle lauree magistrali
- c. Implementazione della formazione ECM in Italia

Prova una esatta

12. Quali tra i seguenti principi attivi è un oppioide?

- a. Morfina
- b. Desametasone
- c. Acido Acetilsalicilico

n. 11 00



13. Cosa deve valutare un infermiere in un paziente portatore di drenaggio:

- a. Colore del liquido drenato
- b. Assenza di sangue nel liquido drenato
- c. Qualità, quantità, caratteristiche del liquido drenato

14. Per valutare la glicemia capillare nell'adulto, le sedi più usate sono:

- a. I polpastrelli delle dita
- b. Le dita dei piedi
- c. La zona addominale

15. Lo scopo di una medicazione di ferita chirurgica è:

- a. Ritardare la guarigione
- b. Favorire la guarigione
- c. Aumentare il sanguinamento

16. Tra le malattie che si trasmettono per via oro fecale:

- a. La tubercolosi
- b. Tumore polmonare
- c. Clostridium Difficile



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

17. L'adeguata cura del piede diabetico comprende:

- Utilizzo frequente di anestetici locali
- Mantenimento dell'idratazione cutanea
- Utilizzo di calzature scomode e strette

18. La sonda di Sengstaken-Bleakemore è utilizzata:

- In caso di emorragia digestiva provocata da rottura di varici esofagee
- In caso di occlusione intestinale
- Per l'alimentazione a breve termine del paziente

19. Cosa si intende con il termine "emottisi"?

- Emissione, con la tosse, di sangue rosso vivo proveniente dal tratto respiratorio
- Emissione di sangue dall'apparato urinario
- Dolore addominale

20. Un'immobilizzazione prolungata può provocare:

- Ridotta espansione polmonare e aumento del rischio di sviluppo di lesioni da pressione
- Aumento dell'appetito
- Aumento della peristalsi

PROVA NON ESTRATTA
h. 11⁰⁰

21. Cosa si intende per T.I.A?

- Trombosi Improvvisa Acuta
- Attacco Ischemico Transitorio
- Nessuna delle opzioni precedenti

22. Secondo la normativa, dopo il decesso il tracciato ECG deve essere registrato per:

- 200 minuti
- 60 minuti
- 20 minuti

23. Che cosa si intende per compliance in un paziente?

- L'impossibilità da parte di un paziente ad assumere i farmaci prescritti
- Il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
- Le complicanze a cui un paziente va incontro assumendo i farmaci prescritti

24. Tosse stizzosa, edemi declivi, intolleranza all'attività fisica, possono essere segni e sintomi di:

- Demenza senile
- Malattia di Parkinson
- Scompenso cardiaco

25. Flapping tremor, spider nevi, ittero e ascite possono essere segni di:

- Demenza senile
- Insufficienza renale
- Cirrosi epatica



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

26. **Quale, tra le seguenti, è una sede per la rilevazione della temperatura corporea:**

- a. Rettale
- b. Interdigitale
- c. Sottomammaria

27. **In caso di stravasamento durante la somministrazione endovenosa di farmaci antitumorali, occorre:**

- a. Interrompere la somministrazione e rimuovere immediatamente il catetere venoso periferico
- b. Interrompere la somministrazione e aspirare il più possibile farmaco e sangue residuo dal catetere venoso periferico
- c. Effettuare un lavaggio del catetere venoso periferico con Mannitolo e riprendere l'infusione

28. **Per valutare la clearance della creatinina si deve:**

- a. Prelevare un campione di urina al mattino
- b. Effettuare la raccolta urine delle 24h
- c. È sufficiente un prelievo di urina in qualsiasi momento del giorno

29. **L'Hospice è un servizio:**

- a. Dedicato ai pazienti terminali
- b. Destinato ai pazienti geriatrici
- c. Ambulatoriale per malattie neurodegenerative

30. **L'applicazione delle calze elastiche nella persona con insufficienza circolatoria venosa degli arti inferiori deve avvenire:**

- a. Al mattino, prima di alzarsi dal letto
- b. Dopo aver camminato
- c. Ogni qualvolta la persona percepisce le gambe appesantite

PROVA NON ESTRATA

11/11/20

05/06/2024

RHO

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

PROVA SCRITTA 3

1. **Con il termine TACHIPNEA si intende:**
 - a. Frequenza respiratoria > 40-60 atti/minuto
 - b. Frequenza respiratoria > 10 atti/minuto
 - c. Frequenza respiratoria < 10 atti/minuto

 2. **Nell'iniezione sottocutanea l'ago deve essere introdotto:**
 - a. Con angolatura di 90°
 - b. Con angolatura di 45°
 - c. Nessuna delle precedenti
- PROVA NON SCRITTA*
H.M.
-
3. **Qual è lo scopo della prevenzione terziaria:**
 - a. Evitare il più possibile le complicanze, le probabilità di recidive e la morte
 - b. Identificare i soggetti asintomatici affetti da una specifica malattia
 - c. Effettuare diagnosi precoce

 4. **Cosa significa STRANGURIA?**
 - a. Emissione difficoltosa di urina, associata a dolore
 - b. Emissione rapida di urina
 - c. Emissione di urina associata a sangue

 5. **In un paziente portatore di catetere vescicale:**
 - a. Il rischio di contaminazione del catetere diminuisce nei sistemi a circuito aperto
 - b. Il rischio di contaminazione del catetere diminuisce nei sistemi a circuito chiuso
 - c. Il rischio di contaminazione diminuisce disconnettendo e/o sostituendo frequentemente la sacca di raccolta delle urine

 6. **Durante le fasi del BLS, alla prima analisi effettuata il DAE comunica che non è indicata la defibrillazione. Come procedi?**
 - a. Pratici la R.C.P. per 2 minuti
 - b. Ricontrolli segni di circolo ogni 30 secondi
 - c. Ventilati due volte e riattivi subito l'analisi

 7. **Sopra quali valori un adulto a digiuno può essere considerato iperglicemico?**
 - a. 50 mg/dL
 - b. 80 mg/dL
 - c. 100-125 mg/dL

 8. **Il paziente in edema polmonare acuto deve essere posizionato:**
 - a. Supino
 - b. Seduto
 - c. Prono



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

9. **L'elettrocardiogramma:**

- a. È un esame diagnostico non invasivo utilizzato per valutare l'attività elettrica del cuore
- b. È un esame invasivo utilizzato per registrare le caratteristiche elettriche delle fibre muscolari e dei nervi periferici
- c. Nessuna delle precedenti

10. **La valutazione del dolore può essere effettuata utilizzando la scala:**

- a. VAS
- b. Conley
- c. BRASS

11. **Secondo il D.M 739/1994 l'assistenza infermieristica è:**

- a. Preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa
- b. Preventiva, curativa, relazionale, educativa
- c. Preventiva, curativa, riabilitativa, educativa

PROVA NON SELEZIONATA
V. 110

12. **Quali tra i seguenti principi attivi è un FANS?**

- a. Furosemide
- b. Ketorolac
- c. Morfina

13. **Il drenaggio toracico deve sempre stare (rispetto alla postura del paziente):**

- a. Al di sopra del torace
- b. Al di sotto del torace
- c. Non c'è una posizione da mantenere

14. **Quale indicazione è necessario dare a una persona sottoposta a chemioterapia per l'esecuzione del cavo orale?**

- a. Usare il filo interdentale
- b. Utilizzare spazzolini a setole dure
- c. Fare sciacqui con fisiologica e bicarbonato

15. **Quale delle seguenti è una tipologia di ferita:**

- a. Emorragia
- b. Ecchimosi
- c. Lacerazione

16. **Quali tra le seguenti malattie può essere trasmessa per via ematogena?**

- a. Epatite C
- b. Clostridium Difficile
- c. Tumore polmonare

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

17. Quali tra le seguenti è una complicanza del diabete:

- a. Faringodinia
- b. Piede diabetico
- c. Disfagia

18. In quale procedura è utilizzato il catetere di Fogarty?

- a. Cateterismo cardiaco
- b. Cateterismo vescicale
- c. Embolectomia

19. Quali delle seguenti sostanze causa più frequentemente ulcera gastrica?

- a. FANS
- b. Diuretici
- c. Integratori alimentari

20. Un'immobilizzazione prolungata **NON** provoca:

- a. Ridotta espansione polmonare e aumento del rischio di sviluppo di lesioni da pressione
- b. Riduzione dell'appetito
- c. Aumento della peristalsi

PROVA NON ESTRATTA
h.u.

21. Cosa si intende per L.E.A.:

- a. Livelli essenziali di Assistenza
- b. Livello ematico arterioso
- c. Livello escretorio arterioso

22. La salma viene identificata mediante:

- a. Il numero del letto
- b. Il giorno di ricovero in reparto
- c. Braccialetto identificativo

23. Con il termine ipossia si intende:

- a. Eccesso di proteine nell'alimentazione
- b. Carenza di ossigeno a livello cellulare
- c. Una tipologia di infezione delle vie urinarie

24. In seguito al cateterismo vescicale estemporaneo quale delle seguenti complicanze si possono verificare?

- a. Ematuria transitoria
- b. Alterazione della perfusione
- c. Alterazione dell'alvo



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

25. Quali, tra i seguenti, sono segni tipici del paziente con cirrosi epatica in fase avanzata?
- Pleurite, varici esofagee, alterazione dello stato cognitivo
 - Ascite, emiparesi, alterazione dello stato cognitivo
 - Ascite, varici esofagee, alterazione dello stato cognitivo
26. In cosa consiste l'accertamento iniziale indispensabile per l'avvio del processo di assistenza?
- Valutazione dei dati esclusivamente riferiti al caregiver
 - Raccolta e integrazione dei dati soggettivi e oggettivi e altre fonti per definire i problemi di salute che caratterizzano la persona assistita
 - Valutazione dei dati rilevabili esclusivamente dalla cartella clinica
27. Per posizionare correttamente il sondino nasogastrico occorre:
- Misurare la lunghezza di introduzione del sondino che deve essere pari alla distanza tra la punta del naso, il lobo dell'orecchio e il processo xifoideo dello sterno
 - Far mangiare il paziente durante la manovra di inserimento
 - Chiedere al paziente di assumere la posizione prona
28. Le eparine a basso peso molecolare vengono somministrate per via:
- Intramuscolare
 - Intraossea
 - Sottocutanea
29. La posizione più idonea per la somministrazione di un clistere evacuativo è:
- Prona
 - Laterale destra con ginocchio sinistro flesso
 - Laterale sinistra con ginocchio destro flesso
30. La sigla TIA indica:
- Una tipologia di accesso vascolare
 - Un deficit focale reversibile di origine vascolare
 - Un esame radiologico

PRONTA NON SCRITTA
h.u



05/06/2024

RHO



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA SCRITTA 4

1. **Con il termine BRADIPNEA si intende:**
 - a. Diminuzione della frequenza respiratoria al di sotto dei 12 atti per minuto
 - b. Aumento della frequenza respiratoria al di sopra dei 12 atti per minuto
 - c. Assenza di atti respiratori per un periodo > 15 secondi

2. **Nell'iniezione intramuscolare l'ago deve essere introdotto:**
 - a. Con angolatura di 90°
 - b. Con angolatura di 60°
 - c. Con angolatura di 45°

3. **L'identificazione precoce di una malattia in soggetti asintomatici rientra tra gli obiettivi della:**
 - a. Prevenzione terziaria
 - b. Prevenzione primaria
 - c. Prevenzione secondaria

4. **Cosa significa NICTURIA?**
 - a. Emissione rapida di urina
 - b. Emissione di urina associata a sangue
 - c. Necessità di urinare frequentemente durante la notte

5. **Quale tra i seguenti materiali NON occorre per posizionare un catetere vescicale a permanenza?**
 - a. Laccio emostatico
 - b. Soluzione disinfettante
 - c. Telo sterile

6. **È un intervento appropriato nel caso in cui il paziente non è cosciente ma respira e ha segni di circolo:**
 - a. Posizionare il paziente in posizione laterale di sicurezza
 - b. Iniziare la R.C.P
 - c. Nessuna delle precedenti

7. **In un adulto a digiuno valori glicemici compresi tra 60-99 mg/dl:**
 - a. Sono ritenuti normali
 - b. Definiscono un paziente in ipoglicemia
 - c. Definiscono un paziente in iperglicemia

8. **Per PA si definisce:**
 - a. La Pressione Venosa Centrale
 - b. La Pressione Arteriosa
 - c. La Pressione Addominale

PROVA ESTRADA
N. M. 8



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

9. **L'elettrocardiogramma (ECG) permette di valutare:**
- L'attività elettrica del cuore
 - L'anatomia delle coronarie
 - La pressione cardiaca
10. **La valutazione del rischio di Lesioni da Decubito può essere effettuata con la scala:**
- Conley
 - Morse
 - Braden
11. **"Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana". Tale enunciato trova riscontro:**
- Nell'art. 32 della Costituzione Italiana
 - Nella Legge 42/99
 - Nel D.M 739/94
12. **Quali tra i seguenti principi attivi è un farmaco Beta-Bloccante?**
- Paracetamolo
 - Atenololo
 - Morfina
13. **Un drenaggio può essere posizionato allo scopo di:**
- Drenare all'esterno del corpo liquidi e/o gas presenti in cavità o distretti corporei
 - Monitorare la quantità e la qualità del materiale fuoriuscito
 - Tutte le precedenti
14. **Le feci picee sono:**
- Di colore verde
 - Di colore rosso
 - Di colore nero perché miste a sangue digerito
15. **Quale tra queste NON è una tipologia di ferita:**
- Escoriazione
 - Lacerazione
 - Acne
16. **Le infezioni da virus respiratorio sinciziale si trasmettono per via:**
- Ematogena
 - Aerea
 - Nessuna delle precedenti
17. **Quali tra le seguenti NON è una complicanza del diabete?**
- Piede diabetico
 - Ipoglicemia
 - Faringodinia

ESTRAZIONE

PROVA

n-u



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

18. Per celiachia si intende l'intolleranza permanente:

- a. Al sale
- b. Al latte
- c. Al glutine

19. Cosa si intende per ARITMIA?

- a. Un disturbo del comportamento
- b. Un disturbo dell'alvo
- c. Un disturbo del ritmo cardiaco o della frequenza cardiaca

20. Prima di essere sottoposto a paracentesi, il paziente deve:

- a. Svuotare la vescica
- b. Bere 1,5 L di acqua
- c. Assumere un disinfettante per le vie urinarie

21. Cosa si intende per R.C.P.:

- a. Rianimazione Cardio Polmonare
- b. Range cardio pressorio
- c. Rianimazione Centrale Polmonare

22. L'identificazione del paziente viene effettuata mediante:

- a. Braccialetto identificativo
- b. Il numero del letto
- c. Il giorno di ricovero in reparto

23. Il deliro è:

- a. Un'alterazione della coscienza dovuta a farmaci che non si assumevano al domicilio
- b. Un disturbo bipolare dovuto a delle benzodiazepine assunte nelle ore notturne
- c. Un disturbo della coscienza caratterizzato da alterazioni di tipo cognitivo che si sviluppa in breve tempo e tende generalmente a evolvere con fluttuazioni che possono avere ciclicità di tempo

24. Quali segni e sintomi può manifestare un paziente con ictus in atto?

- a. Emiplegia o emiparesi
- b. Dolore intenso retrosternale
- c. Frattura patologica dell'omero

25. Flapping tremor, spider nevi, ittero e ascite possono essere segni di:

- a. Demenza senile
- b. Insufficienza renale
- c. Cirrosi epatica

PROVA STRUTTA
M M

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

26. La celiachia è considerata:

- a. Un'allergia stagionale
- b. Una patologia cronica
- c. Una malattia che si trasmette per via aerea

27. L'iscrizione all'albo professionale ai fini dell'esercizio professionale degli infermieri è:

- a. Obbligatoria solo per gli infermieri della sanità pubblica
- b. Obbligatoria per tutti i professionisti
- c. Facoltativa

28. Per la valutazione della funzionalità renale quale dei seguenti esami è più attendibile?

- a. Creatinemia
- b. Amilasemia
- c. Lipasemia

29. Quale manovra deve essere praticata per effettuare una somministrazione auricolare nell'adulto?

- a. Far piegare la testa di lato e portare il padiglione auricolare in avanti
- b. Far piegare la testa in avanti
- c. Far piegare la testa di lato e tirare il padiglione auricolare indietro e verso l'alto

30. In base alle raccomandazioni ministeriali le fiale di KCL devono essere conservate:

- a. Sul carrello della terapia
- b. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta "Farmaco Pericoloso da diluire prima dell'uso"
- c. Insieme ai farmaci per uso parenterale

05/06/2024

RHO

PROVA ESISTITA
N. 40

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

PROVA PRATICA 1

La signora Luisa ha 82 anni, vive con il nipote in una casa in campagna in periferia della città. La signora è sempre stata autonoma ma, da questa mattina, necessita di aiuto nella vestizione e nella deambulazione: trascina infatti la gamba destra e ha difficoltà a muovere il braccio destro. L'infermiere di triage raccoglie l'anamnesi prossima e remota da cui emerge una storia di infarto del miocardio, ipertensione, malattia vascolare periferica, diabete di tipo 2 e obesità. La signora Luisa inoltre è fumatrice e conduce uno stile di vita piuttosto sedentario. L'infermiere procede con la rilevazione dei parametri vitali: PA 160/90 mmHg, FC: 70 bpm; SpO2: 96%; glicemia: 130 mg/dl. Successivamente inserisce un catetere venoso periferico (CVP) e attribuisce all'OSS il trasporto della paziente in Radiologia per l'esecuzione di una TAC senza mezzo di contrasto, come da prescrizione medica. L'esame refertato rileva la presenza di un ictus ischemico. Scala di Conley: 3

Domanda 1: Quali sono i fattori di rischio modificabili che possono aver aumentato il rischio di insorgenza dell'ictus ischemico nella signora Luisa?

- a. Età, genere
- b. Ipertensione, iperlipidemia, abitudine al fumo di sigaretta
- c. Età, diuresi giornaliera, infezioni alle vie urinarie

Domanda 2: Si ritiene necessario posizionare il catetere vescicale per il monitoraggio della diuresi oraria in fase acuta. Quale tipologia di cateterismo vescicale è indicato nel caso clinico descritto?

- a. A permanenza
- b. Estemporaneo
- c. Intermittente

Domanda 3: Nell'inserimento del catetere venoso periferico alla signora Luisa l'infermiere privilegerà:

- a. La vena del dorso della mano destra
- b. La vena basilica destra
- c. La vena basilica sinistra

Domanda 4: Dopo aver rilevato i parametri vitali l'infermiere comunicherà al medico che la paziente è:

- a. Ipotesa
- b. Iperlesa
- c. Tachicardica

Prova Esaurita
ore 14:00



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Domanda 5: Il medico prescrive all'infermiere la somministrazione di un farmaco calcio-antagonista. Quali interventi dovrà effettuare l'infermiere in turno prima della somministrazione del farmaco alla signora Luisa?

- a. Rilevare la glicemia prima e dopo l'assunzione
- b. Rilevare la diuresi prima e dopo la somministrazione
- c. Rilevare pressione arteriosa prima e dopo la somministrazione

Domanda 6: L'infermiere ha somministrato la scala Conley per valutare il rischio di:

- a. Malnutrizione
- b. Caduta
- c. Insonnia

Domanda 7: L'infermiere si accorge che la signora Luisa ha difficoltà nell'articolazione delle parole pertanto:

- a. Incoraggerà la signora Luisa a parlare lentamente e a ripetere le richieste, rassicurerà la paziente riducendo eventuali emozioni di frustrazione e rabbia, fornirà frequenti rinforzi positivi all'assistito per gli sforzi a comunicare
- b. Scoraggerà le visite dei famigliari per stimolare la comunicazione;
- c. Nessuna delle precedenti


Domanda 8: Quale intervento infermieristico è più idoneo per favorire l'idratazione orale nel caso in cui la sig.ra Luisa presentasse anche disfagia ai liquidi?

- a. Somministrare acqua con addensante
- b. Promuovere solo l'idratazione parenterale
- c. Somministrare acqua con l'ausilio del bicchiere

Domanda 9: L'infermiere in turno rileva un alto rischio di cadute, quali sono gli interventi infermieristici che potrà effettuare?

- a. Assicurare alla persona un sistema di chiamata (campanello) con cui possa facilmente chiedere assistenza quando si muove, assicurarsi che l'assistito indossi calzature appropriate (per esempio con soles antiscivolo e sistema di allacciatura sicuro)
- b. Sistemare il paziente in una stanza lontana alla sala infermieri, educare l'assistito a non chiedere aiuto quando si muove
- c. Allontanare dalla portata del paziente il sistema di chiamata (campanello) e non fornire all'assistito materiale educativo che spieghi strategie e misure volte a prevenire le cadute

ROSA ESPOSITA



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Domanda 10: Il medico prescrive la somministrazione di 10 mg di Amlodipina, l'infermiere verifica la disponibilità di Amlodipina 5 mg. Quante compresse dovrà somministrare?

- a. 3 compresse
- b. 1/2 compressa
- c. 2 compresse

05/06/2024

RHO

Pag. 3 di 3

*Area Estratta
de l'ASST*



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

PROVA PRATICA 2

Il signor Franco è un assistito di 59 anni, ricoverato nel reparto di Chirurgia Generale per essere sottoposto a intervento a seguito di diagnosi di tumore al colon-retto. Durante l'accertamento l'infermiere rileva le seguenti informazioni: PA 110/70 mmHg, FC 84 bpm, FR 20 atti/m, SpO2 97% aa, DTX 40 mg/dl, BMI= 20, TC 36.6 °C, NRS=8, Scala di Braden= 22

Domanda 1: In relazione ai valori glicemici, quale segno/sintomo la persona probabilmente manifesta?

- a. Comparsa di cianosi alle estremità delle dita
- b. Nessun segno o sintomo
- c. Sudorazione profusa

Domanda 2: L'infermiere somministra la scala di Braden per:

- a. Identificare il rischio di sviluppare lesioni da pressione
- b. Identificare il rischio di malnutrizione
- c. Identificare il grado di dispnea

Domanda 3: Quali altri dati può raccogliere l'infermiere durante la valutazione del dolore?

- a. Tipologia, localizzazione, eventuale irradiazione
- b. Solo l'intensità
- c. Solo la tipologia

Domanda 4: Dopo aver rilevato i parametri vitali l'infermiere comunicherà al medico che la paziente presenta:

- a. Valori pressori superiori alla norma
- b. Valori pressori nei range di riferimento
- c. Valori pressori inferiori alla norma

Domanda 5: Nella rilevazione della frequenza respiratoria, l'infermiere:

- a. Chiederà al paziente di tossire
- b. Posiziona l'indice e il medio sul polso del paziente
- c. Valuterà il movimento del torace del paziente

Domanda 6: In base al parametro del BMI (20), come si classifica lo stato nutrizionale del signor Franco?

- a. Normopeso
- b. Obesità
- c. Sovrappeso

PROVA NON
ESTRATTA
ORE NON



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Domanda 7: Al signor Franco viene confezionata una colostomia, quali complicanze l'infermiere dovrà presidiare:

- a. Edema, emorragia, necrosi
- b. Infiammazione della faringe
- c. Neuropatia

Domanda 8: Dovendo sostituire il sistema di raccolta della colostomia (due pezzi) come dovrà procedere l'infermiere?

- a. Rimuovere il dispositivo presente procedendo dall'alto al basso senza traumatismi, detergere la cute con acqua e sapone, preparare la placca nuova e farla aderire alla cute, agganciare la sacca alla placca, infine verificare la chiusura della sacca.
- b. Rimuovere il dispositivo presente procedendo dall'alto al basso favorendo traumatismi, detergere la cute con acqua, preparare la placca e farla aderire alla cute, agganciare la sacca alla placca, infine verificare la chiusura della sacca.
- c. Rimuovere il dispositivo presente procedendo dal basso verso l'alto favorendo traumatismi, detergere la cute con un disinfettante, preparare la placca e farla aderire alla cute, agganciare la sacca alla placca.

Domanda 9: Dovendo somministrare mezza compressa di Paracetamolo da 1000 mg, quanti mg si somministrano?

- a. 250 mg
- b. 500 mg
- c. 125 mg

Domanda 10: Nel post operatorio il signor Franco riferisce nausea, quali interventi potrà effettuare l'infermiere:

- a. Sollevare la testata del letto, somministrare i farmaci antiemetici prescritti
- b. Abbassare la testata del letto e avvicinare al paziente sostanze che sono fonte di odori
- c. Consultare il medico per provvedere a un adeguato controllo del dolore e NON somministrare farmaci antiemetici prescritti

05/06/2024

RHO

PROVA NON
ESTRATTA
ORE 1100

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI)

PROVA PRATICA 3

La sig.ra Maria di 88 anni, completamente dipendente nelle attività di vita quotidiana (tra cui lavarsi e vestirsi/svestirsi), vive con la figlia dalla quale è assistita da 2 anni. Questa mattina è caduta dal letto. La figlia la accompagna in Pronto Soccorso dove viene effettuata una radiografia. L'esame refertato rileva una frattura del femore sinistro. La signora Maria viene quindi ricoverata presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia per essere sottoposta, il giorno successivo, ad intervento di "osteosintesi della frattura di femore sinistro". La paziente si presenta vigile ma preoccupata. Il medico prescrive all'ingresso gli esami ematici. L'infermiere che accoglie la signora Maria in Unità Operativa raccoglie i parametri vitali: PA 130/70 mmHg, FC: 90 bpm; SpO2: 96%; NRS: 7 infine valuta l'integrità cutanea.

Domanda 1: Gli esami ematici richiesti per la signora Maria comprendono gli elettroliti sierici. Indicare il range di normalità del potassio:

- a. 3,5 – 5,5 mEq/L
- b. 35 – 55 mEq/L
- c. 350 – 550 mEq/L

Domanda 2: Quali scale di valutazione potrà utilizzare l'infermiere per l'accertamento dell'integrità cutanea nel caso sopra descritto?

- a. Barthel, Must
- b. Barthel, Conley
- c. Braden, Norton,

Domanda 3: Durante l'esecuzione del bagno a letto della paziente quali sono i principi che l'infermiere deve rispettare?

- a. Eseguire le cure igieniche limitando l'utilizzo di acqua per rispettare il film idrolipidico. Presidiare la privacy e comfort, evitando di valorizzare l'autonomia residua della persona (empowerment);
- b. Presidiare comfort e privacy del paziente, valorizzando l'autonomia residua della persona (empowerment). Evitare traslocazione della flora batterica cutanea procedendo dalla zona più pulita a quella più sporca, dall'alto verso il basso e dall'interno verso l'esterno;
- c. Favorire la traslocazione della flora batterica cutanea procedendo dalla zona più sporca a quella più pulita, dall'alto verso il basso.

Domanda 4: La figlia della signora Maria riferisce, durante l'accertamento iniziale, che la madre non si scarica da una settimana, aggiunge inoltre che la madre ha una frequenza di evacuazioni abituale di due volte a settimana da circa un anno con feci caprine. Quale dei seguenti, è un intervento appropriato e prioritario rispetto alla situazione descritta:

- a. Eseguire un clistere evacuativo
- b. Monitorare la deambulazione del paziente
- c. Inserire un accesso venoso

PROVA NON ESTRATTA



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

PROVA PRATICA 4

Il Sig. Abed, 40 anni e originario del Senegal, è ricoverato presso l'U.O. di Medicina per ipertensione e diarrea in paziente con Alzheimer. All'ingresso in U.O il signor Abed si presenta agitato e non collaborante. In anamnesi Diabete di tipo 1. Dall'accertamento iniziale l'infermiere rileva che il paziente presenta una mobilità limitata: cambia occasionalmente posizione del corpo e delle estremità ed è incapace di fare frequenti o significativi cambiamenti di posizione nel letto senza aiuto. Presenta inoltre difficoltà di masticazione e disfagia ai liquidi e solidi; BMI: 17, MUST: 5

Domanda 1: Il sig. Abed presenta disfagia a liquidi e solidi e non è in grado di alimentarsi in autonomia. Quale tra i comportamenti elencati, **NON** è appropriato per la situazione durante la somministrazione del pasto?

- Posizionare il paziente in posizione seduta con il capo flesso leggermente in avanti
- Utilizzare un addensante per i liquidi
- Far assumere rigorosamente al signor. Abed la posizione laterale di sicurezza

Domanda 2: Nell'ambito della valutazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione, l'infermiere deve:

- Rilevare il rischio all'ingresso in U.O. e ad intervalli regolari (almeno settimanalmente)
- Rilevare il rischio ad ogni variazione della situazione clinico-assistenziale del paziente
- Entrambe le risposte sono corrette

Domanda 3: Secondo il BMI rilevato il paziente è:

- Sottopeso
- Sovrappeso
- Normopeso

Domanda 4: Quale modalità di rilevazione della TC è appropriata alla situazione descritta?


- Utilizzo della sede rettale in quanto facilmente accessibile in un paziente agitato
- Utilizzo della sede ascellare in quanto è la più invasiva, la più accessibile e la più utilizzata in caso di paziente non collaborante
- Utilizzo della sede auricolare in quanto non invasiva, rapida e riflette la temperatura interna

Domanda 5: Quante compresse da 0.25 mg si devono somministrare per ottenere 0.50 mg di dosaggio?

- Mezza compressa
- 5 compresse
- 2 compresse

Domanda 6: La scala MUST viene somministrata al signor Abed per identificare:

- Il rischio di malnutrizione
- Il rischio di caduta
- Il rischio di aspirazione



PROVA PRATICA TURNO B. 20

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

Domanda 7: Quali tra le seguenti rappresentano attività infermieristiche appropriate per promuovere l'orientamento e la comunicazione con il signor Abed?

- Usare il tocco se appropriato, rassicurare l'assistito con una frequente comunicazione terapeutica, incoraggiare la famiglia/altre persone significative a rimanere con il paziente, dare spiegazioni e istruzioni brevi e semplici, ripetere se necessario
- Usare il tocco se appropriato, scoraggiare la famiglia/altre persone significative a rimanere con il paziente, non dare spiegazioni al paziente
- Evitare di orientare l'assistito e evitare che il paziente indossi il braccialetto di identificazione

Domanda 8: L'infermiere potrà ridurre i danni da frizione preservando l'integrità cutanea del paziente attraverso:

- L'uso sistematico di prodotti emollienti e idratanti e di pellicole o film barriera
- L'uso di soluzioni disinfettanti
- L'uso di antisettici ad alto potere schiumogeno

Domanda 9: In relazione alla diarrea quali aspetti l'infermiere provvederà ad indagare nella conduzione dell'accertamento?

- Frequenza delle scariche diarroiche, colorazione delle feci, consistenza delle feci utilizzando la scala Bristol
- Dieta, assunzione di liquidi, integrità della cute, eventuale alopecia
- Consistenza delle feci utilizzando la scala di Bristol, utilizzo di presidi assorbenti, esame obiettivo dell'equilibrio

Domanda 10: L'infermiere osserva che il paziente presenta brividi ed è arrossato in viso. L'infermiere decide di rilevare nuovamente la temperatura perché:

- Il paziente presenta dei sintomi riconducibili ad un nuovo rialzo febbrile
- È plausibile che il paziente sia in fase di defervescenza o comunque apiretico
- Il paziente ha un rialzo pressorio

05/06/2024

RHO

PROVA ESTIVA TUNO 8-30

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 1

Il candidato descriva le modalità di valutazione del dolore nel paziente e la gestione assistenziale

PROVA ESISTITA ORE 30
[REDACTED]
REGIONE LOMBARDA
ASST RHODENSE
13

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 1

The effect of reminiscence therapy on cognitive functions, depression, and quality of life in Alzheimer patients: Randomized controlled trial

Neslihan Lök¹, Kerime Bademli², Alime Selçuk-Tosun³

Abstract

Alzheimer is a disease leading to various neuropsychiatric behavioral disorders.

The aim of the present study is to investigate the effect of reminiscence therapy on cognitive functions, depression, and quality of life in Alzheimer's patients.

Mini-Mental Test, depression, and quality of life mean scores of the elderly in intervention group before reminiscence therapy program increased after the administration, and the difference was statistically significant ($P < 0.05$). In the intergroup comparison, a significant difference was found between elderly individuals' posttest Mini-Mental Test, depression, and quality of life mean scores ($P < 0.05$).

Our results suggest that regular reminiscence therapy should be considered for inclusion as routine care for the improvement of cognitive functions, depressive symptoms, and quality of life in elderly people with Alzheimer.

PROVA ORALE 8³⁰ ESTRATTA



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 1

Il candidato descriva cosa si intende per "mouse"

PROVA ORALE ORE 8³⁰
ESPRATA



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 2

Il candidato descriva cos'è il programma "Word"

PROVA ESTRATTA h 11



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 2

Il candidato descriva le modalità di valutazione del rischio di sviluppare lesioni da pressione e le strategie di prevenzione

PROVA ESTRATA h 11



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 2:

Best practice updates for nursing care in weight loss surgery

Ann T Mulligan¹, Anne M McNamara, Hannah W Boulton, Linda S Trainor, Carol Raiano, Ann Mullen

Abstract

The objective of this study is to update evidence-based best practice guidelines for nursing in weight loss surgery (WLS).

We performed a systematic search of English-language literature on WLS and perioperative nursing, postoperative, anesthesia, and discharge published between April 2004 and May 2007 in MEDLINE, CINHAI and the Cochrane Library.

Key words were used to narrow the search for a selective review of abstracts, retrieval of full articles, and grading of evidence according to systems used in established evidence-based models.

From these, we developed evidence-based best practice recommendations from the most recent literature on nursing in WLS. We identified >54 papers; the most relevant were reviewed in detail. Regular updates of evidence-based recommendations for best practices in WLS nursing are required to address advances in surgery and anesthesiology, as well as changes in the demographics and levels of obesity in WLS patients.

Key factors in patient safety include staff education, comprehensive admission assessment, patient education, careful preoperative surveillance and postoperative care, and long-term discharge follow-up.

PROVA ~~PROVA~~ ESTORATA h 11
10/06/2024 [REDACTED] REGIONE LOMBARDIA ASST RHO
Garbagnate Milanese

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 3

Il candidato descriva cos'è il programma "Excel"

PROVA NON ESTRATTA
h 11⁰⁰



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 3

Guideline implementation: preoperative patient skin antisepsis

Liz Cowperthwaite, Rebecca L Holm

Abstract

Performing preoperative skin antisepsis to remove microorganisms at the surgical site may help prevent patients from developing a surgical site infection.

The updated AORN "Guideline for preoperative skin antisepsis" addresses the topics of preoperative patient bathing and hair removal, selection and application of skin antiseptics, and safe handling, storage, and disposal of skin antiseptics.

This article focuses on key points of the guideline to help perioperative personnel develop protocols for patient skin antisepsis.

The key points include the need for the patient to take a preoperative bath or shower and the need for perioperative personnel to manage hair at the surgical site, select a safe and effective antiseptic for the individual patient, perform a safe preoperative surgical site prep, and appropriately store skin antiseptics.

Perioperative RNs should review the complete guideline for additional information and for guidance when writing and updating policies and procedures.

PROVA NON ESTRATTA

h 14²⁰



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 3

Il candidato descriva le modalità di valutazione del rischio di caduta e le strategie di prevenzione

PROVA NON ESTRATTA

b 11^{cc}




N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 4

Il candidato descriva le modalità di rilevazione della temperatura corporea e l'assistenza al paziente piretico

PROVA NON ESTRATA
h h "



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 4

Il candidato descriva cos'è il programma
"PowerPoint"

PROVA NON ESTRATTA

h11^a



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 4

Perioperative Strategies for Surgical Site Infection Prevention

Marie A Bashaw, Kathy J Keister

Abstract

Surgical site infections (SSIs) are some of the most common and costly health care-associated infections.

Although the rate of SSIs has declined significantly in the past decade, patient safety remains at risk.

Perioperative nurses employ a variety of evidence-based best practices to prevent SSIs and facilitate a safe surgical experience for their patients, including hand hygiene, preoperative patient skin antisepsis, and antimicrobial irrigation.

This article explores the causes of SSIs, such as modifiable and nonmodifiable patient factors and preoperative, intraoperative, and postoperative procedural factors, and discusses some of the specific recommended strategies related to the prevention of SSIs that perioperative nurses can initiate in their workplace.

PROVA NON ESTRATTA

h11



10/06/2024

Garbagnate Milanese

N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 1

Il candidato descriva la gestione assistenziale al paziente con PONV (nausea e vomito post-operatorio)

Prova orale statale al 11.00



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 1

Ventilator-Associated Pneumonia and Role of Nurses in Its Prevention

Chadani Osti¹, Deepa Wosti², Bimala Pandey³, Qinghua Zhao¹

Abstract

Ventilator-associated pneumonia (VAP) is one of the most frequent nosocomial infections among ventilated patients in ICUs, associated with an increase in days of ICU stay, morbidity, and mortality.

Its prevention is a significant concern in every hospital. Most of the interventions and prevention strategies are part of routine nursing care.

Nurses have different vital roles such as care provider, manager, educator, coordinator, and evaluator in preventing VAP.

Lack of knowledge of infection prevention and proper nursing care among nurses may become a barrier in adhering to evidence-based guidelines for preventing ventilator-associated pneumonia.

This study will help nurses to know about VAP and its prevention in detail so that they can apply the knowledge in clinical practice. Understanding pathophysiology of VAP, its risk factors, and care bundle is vital for the proper prevention and treatment of VAP.

There must be specific protocols, strategies and active surveillance in every ICU regarding the care bundle.

Passo Shetao 11.00



11/06/2024

Garbagnate Milanese



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 1

Il candidato descriva a cosa serve la “penna
USB”

Penne USB al 19.00



11/06/2024

Garbagnate Milanese



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 3

Il candidato descriva la “sindrome da immobilizzazione” e i rischi correlati

Prova esultante
h.s. >



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 3

Effective communication with people who have dementia

Dev Jootun¹, Gerry McGhee

Abstract

This article explores the skills needed for effective communication with people who have dementia. It describes the factors that influence the communication process and the effect this may have on the nurse-patient therapeutic relationship. Cognitive impairment in people with dementia may limit their ability to communicate effectively. This may, in turn, affect the nurse's ability to identify patients' needs. Communication is central to providing good dementia care. The article examines some of the challenges nurses may face when caring for this patient group and suggests some strategies to overcome any barriers, enhance quality of care and improve patient outcomes.

Prova eshalte
h-8



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 3

Il candidato descriva cos'è la "PEC"

Prova estorale

h. 8³⁰






N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 2

Il candidato descriva cosa si intende con il termine "*monitor*"

Passo solo al 11:00 non statta



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 2

Leadership in nursing: The importance of recognising inherent values and attributes to secure a positive future for the profession

Natashia Josephine Scully

Abstract

Nursing is a dynamic and challenging profession requiring engaging and inspiring role models and leaders.

In today's ever changing and demanding healthcare environment, identifying and developing nurse leaders is one of the greatest challenges faced by the nursing profession.

The concept of leadership is a complex and multi-dimensional phenomenon; research conducted for over a century concludes that although it is one of the most observed concepts, no universally accepted definition or theory of leadership actually exists.

With appropriate identification, support and development of future nurse leaders, an acknowledgement of the shifting paradigm of leadership theory and the context in which future nurse leaders are destined to grow, the ultimate goal of the nursing profession-- excellent in person centred care--can be achieved. It is essential to the future success of the nursing profession that informal, negative "leaders" be discouraged and positive leaders, possessing the evidence-based qualities of leadership be identified and nurtured to lead the profession.

Primo doll al 11:00 non stato



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 2

Il candidato descriva cosa si intende per “stipsi”,
le modalità di prevenzione e gli interventi
assistenziali.

Primo ordine al 1°°° non stitico






N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 4

Il candidato descriva cos'è la "Password"

Passo orel non stato al 11.00



N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 4

Nurses' burnout and associated risk factors during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis


Petros Galanis¹, Irene Vraka², Despoina Fragkou¹, Angeliki Bilali³, Daphne Kaitelidou¹

Abstract

Nurses experience high levels of burnout during the COVID-19 pandemic, while several sociodemographic, social and occupational factors affect this burnout.

We found that burnout among nurses is a crucial issue during the COVID-19 pandemic. There is an urgent need to prepare nurses to cope better with COVID-19 pandemic. Identification of risk factors for burnout could be a significant weapon giving nurses and health care systems the ability to response in a better way against the following COVID-19 waves in the near future.

Prova orale non svolta
02/11/20





N. 40 POSTI DI INFERMIERE (AREA PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI).

DOMANDA 4

Il candidato definisca i segni e sintomi di ipoglicemia e l'assistenza infermieristica.

Prova orale non svolta ore 11:00

