

Vaccinarsi in gravidanza è un atto d'amore importante per proteggere la propria salute e quella del suo bambino. Ad oggi non esistono vaccini che siano in grado di garantire una protezione ai bambini nei primi 3 mesi di vita, vaccinandosi in gravidanza, proteggiamo anche loro. Per ogni dubbio è possibile rivolgersi all'ostetrica dei consultori, al ginecologo e/o consultare il proprio Medico di medicina generale o il pediatra.

**Per informazioni e prenotazioni sulle vaccinazioni** è possibile contattare il CALL CENTER al numero verde gratuito 800.671.671, attivo dalle ore 9.00 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì (*esclusi i festivi*).

#### **Bollate**

Via Piave, 210 (PAD. 63 - 3° piano)

✉ [vaccinazioni.bollate@asst-rhodense.it](mailto:vaccinazioni.bollate@asst-rhodense.it)

Comuni afferenti:

Bollate, Baranzate, Novate M.se, Garbagnate M.se, Cesate, Solaro

#### **Paderno Dugnano**

Viale della Repubblica, 13

✉ [vaccinazioni.paderno@asst-rhodense.it](mailto:vaccinazioni.paderno@asst-rhodense.it)

Comuni afferenti:

Paderno Dugnano, Senago

#### **Passirana**

Via Settembrini, 1 (ALA EST - 3° piano)

✉ [vaccinazioni.rho@asst-rhodense.it](mailto:vaccinazioni.rho@asst-rhodense.it)

Comuni afferenti:

Rho, Pregnana M.se, Pogliano M.se, Vanzago, Arese, Lainate, Pero

#### **Settimo Milanese**

Via Libertà, 33 (1° piano)

✉ [vaccinazioni.rho@asst-rhodense.it](mailto:vaccinazioni.rho@asst-rhodense.it)

Comuni afferenti:

Cornaredo, Settimo Milanese

#### **Corsico**

Via Marzabotto, 12

✉ [vaccinazioni.corsico@asst-rhodense.it](mailto:vaccinazioni.corsico@asst-rhodense.it)

Comuni afferenti:

Assago, Buccinasco, Corsico, Cesano Boscone, Trezzano S/N, Cusago

## VACCINAZIONI in gravidanza



Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia  
ASST Rhodense

## Vaccinazione DPTA - Difterite Tetano Pertosse

**Settimana di gravidanza: 3° trimestre o 28 settimane.**

E' raccomandata nel 3° trimestre di gravidanza, idealmente intorno alla 28 settimana, in modo che gli anticorpi prodotti dalla mamma passino al feto. Infatti, il neonato è estremamente a rischio di contrarre la pertosse nei primi mesi di vita.

La vaccinazione è raccomandata ad ogni gravidanza, anche se sei già stata vaccinata.

E' raccomandata anche per i familiari e le persone che accudiranno il neonato.

Se non viene eseguita durante la gravidanza, potrai essere vaccinata successivamente, anche se il suo effetto protettivo sul neonato attraverso il latte è inferiore.

## Vaccinazione MPR - Morbillo Parotite Rosolia e Varicella

I vaccini contro il morbillo, parotite, rosolia e varicella, contengono virus vivi attenuati, non possono essere somministrati in gravidanza.

Il ciclo vaccinale va completato (due dosi) almeno un mese prima di cercare una gravidanza.

Se non sono state eseguite prima della gravidanza, è raccomandato vaccinarsi subito dopo il parto, anche durante l'allattamento.

Può richiedere il vaccino durante il suo ricovero o nel post parto, presso i consultori, dove le ostetriche le indicheranno il percorso.

**DIFTERITE:** colpisce prevalentemente la gola e le vie aeree. Può causare complicazioni a livello cardiaco, renale o del sistema nervoso, sia nei bambini, soprattutto se neonati, sia negli adulti, soprattutto se in gravidanza. Chi

si ammala è contagioso per almeno 6 settimane, anche se ha contratto la malattia in modo lieve.

**TETANO:** infezione contratta a causa di un ferita con oggetti contaminati. Il batterio produce una tossina che agisce sul sistema nervoso causando un quadro molto severo, anche mortale.

**PERTOSSE:** mette a rischio la salute della donna in gravidanza ed è causa di un'alta mortalità soprattutto nei bambini. È spesso trasmessa dalla madre o da altro familiare.

**MORBILLO:** malattia infantile con potenziali gravi conseguenze, pericolosa se contratta in gravidanza per un maggior tasso di rischio di aborto e parto prematuro. Contratta nell'ultimo mese di gravidanza espone il neonato al rischio di morbillo neonatale, gravato da complicazione ed elevati tassi di mortalità.

**ROSOLIA:** molto pericolosa se contratta in gravidanza,

soprattutto nel primo trimestre, per l'alto rischio di malformazioni congenite sul feto (90%).

**PAROTITE:** in gravidanza non produce malformazioni fetali, ma se contratta nel primo trimestre aumenta il rischio di aborto del 25%.

**VARICELLA:** nella gravida può provocare complicazioni quali la meningite, polmonite, encefalite, può inoltre causare danni fetali nel 0,5 / 1% dei casi di infezione nella prima metà della gravidanza, come lesioni oculari, cutanee e del sistema nervoso centrale.

L'infezione nell'ultimo mese di gravidanza crea il rischio di varicella del neonato con possibili complicazioni ed aumento della mortalità.